

2. DÉTERMINANTS NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ

2.1. Consommation de tabac et d'alcool à 15 ans

La consommation régulière de tabac ou l'abus d'alcool dans l'adolescence a des conséquences négatives pour la santé, immédiates et à long terme. Les enfants qui prennent l'habitude de fumer au début de l'adolescence augmentent leurs risques de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires et de cancer. Ils sont aussi plus susceptibles de faire l'expérience de l'alcool et d'autres drogues. L'abus d'alcool est lui-même associé à un ensemble de problèmes sociaux, physiques et de santé mentale, comme la dépression et l'anxiété, l'obésité ou les blessures accidentelles (Currie et al., 2008).

Les résultats des enquêtes HBSC (Health Behavior in School-aged Children), série d'études collaboratives plurinationales conduites dans la plupart des pays de l'OCDE, permettent de suivre les comportements des adolescents en matière de tabac et d'alcool. En général, à l'heure actuelle, les filles fument plus que les garçons mais un plus grand nombre de garçons se saoulent. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, la prévalence de la consommation de tabac et de l'abus d'alcool double entre l'âge de 13 ans et l'âge de 15 ans.

Les adolescents de 15 ans en Autriche, Finlande, Hongrie, République tchèque et Italie, sont les plus nombreux à fumer au moins une fois par semaine, avec des proportions de 20 % ou plus chez les garçons et chez les filles (graphique 2.1.1). À l'opposé, pas plus de 10 % des adolescents de 15 ans aux États-Unis, au Canada et en Suède, fument au moins une fois par semaine. La plupart des pays déclarent des taux de consommation de tabac plus élevés pour les filles, bien que la différence ne dépasse 5 % qu'en Espagne et en Autriche. La Grèce, la Finlande, la Hongrie, l'Islande, la Pologne et la République slovaque sont les seuls pays où la prévalence du tabac est plus élevée chez les garçons.

Les adolescents de 15 ans sont au moins 40 % à déclarer avoir été en état d'ébriété au moins deux fois dans leur vie au Danemark, au Royaume-Uni et en Finlande (graphique 2.1.2). Dans l'ensemble des pays couverts par l'enquête, 29 % des filles et 33 % des garçons ont été ivres à deux occasions ou plus, avec des taux beaucoup plus bas aux États-Unis et dans des pays méditerranéens comme la Grèce, l'Italie et le Portugal. Les écarts les plus élevés entre les garçons et les filles sont en Suisse, en Belgique, en Hongrie et en République slovaque, avec des taux d'abus d'alcool plus élevés de 5 à 10 points de pourcentage chez les garçons. En Pologne, les écarts sont encore plus élevés, avec plus de 10 points de pourcentage de plus chez les garçons. La Norvège, l'Espagne, le Canada et le Royaume-Uni sont les seuls pays où les filles sont plus nombreuses à déclarer des abus d'alcool répétés, mais dans chaque cas, l'écart est inférieur à 5 points de pourcentage.

Le graphique 2.1.3 montre les différences de tabagisme et de consommation d'alcool excessive entre les garçons et les filles de 15 ans. Les pays au-dessus de la droite à

45 degrés ont des taux plus élevés pour les filles, et les pays au-dessous de cette droite des taux plus élevés pour les garçons. Les pays qui ont des taux de consommation de tabac élevés chez les garçons déclarent dans bien des cas des taux élevés chez les filles, et il en est de même pour l'alcool.

On a aussi des données concernant l'expérience de l'ébriété pour les enfants de 13 ans (Currie et al., 2008). À cet âge, plus d'un enfant sur dix au Royaume-Uni, en Finlande, au Canada et en République slovaque, a été ivre au moins deux fois. En Pologne et en Hongrie, on constate aussi des taux élevés d'abus d'alcool répétés à l'âge de 13 ans chez les garçons. L'augmentation relative la plus forte entre les âges de 13 et 15 ans concernant les abus d'alcool s'observe en Norvège, en Islande et en Suède, mais le taux à l'âge de 15 ans dans chacun de ces pays reste en dessous de la moyenne.

Ces comportements à risque chez les adolescents diminuent, avec une certaine baisse de la consommation d'alcool et de cigarettes à l'âge de 15 ans par rapport aux niveaux observés à la fin de la décennie 90 (graphique 2.1.4). À l'exception de la Grèce, tous les pays de l'OCDE couverts par l'enquête montrent une baisse des taux de consommation de tabac aussi bien pour les garçons que pour les filles. Les taux de consommation de tabac pour les deux sexes sont au plus bas depuis dix ans avec, en moyenne, moins d'un enfant sur cinq, garçons ou filles, fumant régulièrement. On constate aussi une certaine convergence entre les pays concernant ces comportements à risque : chez les filles pour le tabac et chez les garçons et les filles pour les abus d'alcool.

Définition et écarts


Les estimations concernant le tabac sont définies par la proportion des enfants de 15 ans qui déclarent fumer au moins une fois par semaine. Les estimations concernant les abus d'alcool sont définies par la proportion des enfants de 13 ans, ou des enfants de 15 ans, qui déclarent avoir été ivres au moins deux fois dans leur vie.

Les données, qui concernent 24 pays de l'OCDE, sont tirées des enquêtes HBSC réalisées entre 1992-93 et 2005-06. Elles proviennent d'échantillons construits à partir des écoles. Les résultats fournis par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ne couvrent que certaines régions. L'enquête n'a pas eu lieu en Australie, au Japon, en Corée, au Mexique ni en Nouvelle-Zélande. La Turquie est incluse dans l'enquête HBSC de 2005-06, mais les enfants n'y ont pas été interrogés sur l'alcool et le tabac.

2. DÉTERMINANTS NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ


2.1. Consommation de tabac et d'alcool à 15 ans

2.1.1 Tabagisme parmi les enfants de 15 ans, 2005-06




Source : Currie et al. (2008).

2.1.2 Consommation d'alcool excessive parmi les enfants de 15 ans, 2005-06




2.1.3 Comportements à risque parmi les enfants de 15 ans, par sexe, 2005-06



Source : Currie et al. (2008).

2.1.4 Évolution des comportements à risque parmi les enfants de 15 ans, moyenne OCDE



Source : Currie et al. (2000, 2004, 2008); OMS (1996).

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/721350881784>



Extrait de :
Health at a Glance 2009
OECD Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/health_glance-2009-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2009), « Consommation de tabac et d'alcool à 15 ans », dans *Health at a Glance 2009 : OECD Indicators*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/health_glance-2009-16-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.