

# 1. ÉTAT DE SANTÉ

## 1.13. Incidence du sida

Les premiers cas de syndrome immunodéficitaire acquis (sida) ont été diagnostiqués il y a presque 30 ans. Le sida est normalement déclenché par une infection par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) et peut se manifester par de nombreuses maladies différentes, telles que la pneumonie et la tuberculose, car le système immunitaire n'est plus en mesure de défendre l'organisme. L'infection par le VIH, le diagnostic du sida et le décès provoqué par une infection peuvent être séparés par un nombre d'années très variable selon le traitement administré. Malgré les recherches à l'échelle mondiale, il n'existe pas actuellement de traitement permettant de guérir la maladie.

En 2006, le nombre de nouveaux cas déclarés de sida s'élevait à environ 45 000 dans les pays de l'OCDE, soit un taux d'incidence moyen non pondéré de 16,2 par million d'habitants (graphique 1.13.1). Depuis les premiers cas de sida signalés au début des années 80, leur nombre a rapidement augmenté pour culminer à plus de 45 nouveaux cas par million d'habitants en moyenne dans les pays de l'OCDE dans la première moitié des années 90, soit près de trois fois les taux d'incidence actuels (graphique 1.13.2). Des campagnes de sensibilisation du public ont contribué à une baisse régulière du nombre de cas déclarés pendant la deuxième moitié des années 90. De plus, le développement des antirétroviraux, qui réduisent ou ralentissent le développement de la maladie, et un accès plus large à ces thérapies ont conduit à une forte diminution de l'incidence entre 1996 et 1997.

Les États-Unis ont constamment présenté les taux d'incidence du sida les plus élevés des pays de l'OCDE, même s'il est important de noter que les définitions régissant l'enregistrement des cas ont été élargies en 1993 et différent par conséquent de celle utilisée en Europe et dans les autres pays de l'OCDE. La modification de la définition explique également la forte augmentation des cas aux États-Unis en 1993 (graphique 1.13.2). En Europe, l'Espagne a régulièrement affiché les taux d'incidence les plus élevés dans la première décennie qui a suivi l'apparition de la maladie, avec toutefois une brusque baisse depuis 1994, laissant le Portugal afficher le taux le plus élevé d'Europe. Les pays d'Europe centrale et de l'Est comme la République tchèque, la République slovaque et la Hongrie, mais aussi la Turquie, la Corée et le Japon déclarent les taux d'incidence du sida les plus faibles des pays de l'OCDE.

Aux États-Unis, plus d'un million de personnes vivent actuellement avec le VIH/sida, dont plus de 450 000 avec le sida (CDC, 2008). Près des trois quarts des nouveaux cas de sida diagnostiqués en 2006 concernaient des hommes, et les minorités raciales et ethniques continuent d'être touchées par l'épidémie de façon disproportionnée. Au Canada, les populations autochtones sont surreprésentées. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les rapports homosexuels masculins non protégés demeurent le principal facteur de risque d'infection par le VIH. En Europe occidentale et centrale, les migrants représentent environ 75 % des infections par le VIH acquises de manière hétérosexuelle.

Ces dernières années, la baisse générale du nombre de cas de sida s'est ralentie. Ce changement de tendance s'est accompagné d'éléments montrant un accroissement de la transmission du VIH dans un certain nombre de pays européens (ECDC et OMS, 2008), attribué à une confiance complaisante à l'égard de l'efficacité des traitements et à un affaiblissement de la sensibilisation du public aux risques que présente la consommation de drogues et certaines pratiques sexuelles. Pour faire à nouveau reculer les taux d'incidence du sida, il faudra mettre en œuvre des programmes plus intensifs de prévention destinés et adaptés aux personnes les plus à risque d'être infectées par le VIH (ONUsida, 2008).


### Définition et écarts

Le taux d'incidence du sida est le nombre de nouveaux cas par million d'habitants dans l'année du diagnostic. Il convient de noter que les données portant sur les années récentes sont provisoires en raison des délais de notification qui peuvent parfois être de plusieurs années selon les pays.

En 1993, les États-Unis ont étendu leur définition des cas de sida pour y inclure le critère de numération des lymphocytes T. Cet élargissement de la définition a abouti à une forte augmentation du nombre de nouveaux cas aux États-Unis en 1993 et explique en partie les divergences actuelles de l'incidence du sida observées entre les États-Unis et les autres pays de l'OCDE.


### 1.13.1 Taux d'incidence du sida, 2006

Nouveaux cas par million d'habitants



1. Moyenne sur trois ans (2004-06).

### 1.13.2 Évolution de l'incidence du sida dans quelques pays de l'OCDE, 1981-2006



Note : Les États-Unis ont étendu leur définition des cas avérés de sida en 1993.

Source : Eco-Santé OCDE 2009. Les données pour les pays européens sont extraites de European Centre for Disease Prevention and Control (« HIV/AIDS surveillance in Europe, 2007 »).

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/721265218220>



Extrait de :  
**Health at a Glance 2009**  
OECD Indicators

Accéder à cette publication :  
[https://doi.org/10.1787/health\\_glance-2009-en](https://doi.org/10.1787/health_glance-2009-en)

**Merci de citer ce chapitre comme suit :**

OCDE (2009), « Incidence du sida », dans *Health at a Glance 2009 : OECD Indicators*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: [https://doi.org/10.1787/health\\_glance-2009-15-fr](https://doi.org/10.1787/health_glance-2009-15-fr)

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à [rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org). Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com) ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) [contact@cfcopies.com](mailto:contact@cfcopies.com).